

# LEPTOSPIROSE



C'est une maladie **infectieuse** due à de petites bactéries, très résistantes dans le milieu extérieur (plusieurs mois voire années). Il existe plusieurs sérovars différents.

## TRANSMISSION ET CONTAMINATION DU TROUPEAU

La contamination se fait par **voie orale**, lorsque les animaux ingèrent des **aliments ou de l'eau souillés** par des urines d'animaux infectés.

Etant donné que les **rongeurs** sont porteurs de la maladie, leur urine peut contaminer les **aliments** du troupeau.

## LES SYMPTÔMES

Les bactéries se localisent dans le foie, les reins ou les organes génitaux. Les lésions alors occasionnées peuvent être irréversibles. Il faut environ 2 semaines d'incubation pour voir apparaître les 1ers signes cliniques :

- Hyperthermie
- Perte d'appétit
- Jaunisse (hépatite)



## LE DIAGNOSTIC

Il peut se faire par **sondage sérologique** en cas de suspicion. Les anticorps sont détectés 10 jours après la primo infection.

## LES MOYENS DE LUTTE

*Curatif* : antibiothérapie dans les cas les plus graves (à raisonner avec votre vétérinaire)

*Préventif* :

- Dératisation
- Sécurisation des zones d'abreuvement
- Drainage des abords des bâtiments
- Nettoyage et vidange régulière des abreuvoirs et des bacs à eau
- Vide sanitaire 1 fois/an au minimum

