

# PARATUBERCULOSE



C'est une **inflammation de l'intestin** chronique, contagieuse et causée par une **bactérie** de la même famille que le bacille de la tuberculose.

## TRANSMISSION ET CONTAMINATION DU TROUPEAU

La contamination se fait par **voie orale**, suite à **l'ingestion** de nourriture, d'eau ou de lait contaminés par les bouses des animaux infectés. La contamination est **précoce** car elle a le plus souvent lieu dans les premières semaines de vie.

Les bactéries se localisent dans la **muqueuse de l'intestin grêle** et dans les ganglions lymphatiques de la zone. En se multipliant, les bacilles causent des lésions **intestinales**.

La période **d'incubation** est de **plusieurs années** (en moyenne 2 à 4 ans).

Il existe plusieurs stades : infecté non excréteur, infecté excréteur et les animaux malades



**Troupeau laitier :**  
**100 à 200€ de perte / bovin non malades excréteurs**  
**Et jusqu'à 2000€/ bovin malade**

## LES SYMPTÔMES

On observe une **diarrhée persistante et rebelle aux traitements** avec des produits habituels. On note également un fort **amaigrissement**, un **affaiblissement** notable et la **mort** de l'animal survient en général après **quelques semaines**.

## DIAGNOSTIC

Par coproculture (long), recherche PCR sur des bouses ou recherche d'anticorps en ELISA sur du sang.

## LES MOYENS DE LUTTE

Il n'existe pas de traitement et il faut donc apprendre à maîtriser la maladie.

Cette maîtrise passe par plusieurs points :

- **Isolement** et **élimination** des **animaux malades** et des **excréteurs**
- Avoir une **bonne hygiène** dans le bâtiment
- Raisonner son **épandage**
- **Séparer les jeunes dès la naissance** (laitiers) ou faire une conduite en **lots** (allaitants).

*Le GDS peut vous proposer un plan de maîtrise*

Pour plus d'informations

Contactez le GDS 63 au 04.44.44.76.30

(David PICARD)